



www.estudar.com.vc

Álgebra Linear

Resumo Conceitos Básicos





Mudança de base

Colocar as coordenadas do vetor em notação matricial

$$[\vec{v}]_B = \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{bmatrix}, [\vec{v}]_F = \begin{bmatrix} x_F \\ y_F \\ z_F \end{bmatrix}$$

$[\vec{v}]_B = M_{BF}[\vec{v}]_F$, tal que a matriz de mudança de base é construída colocando as coordenadas dos vetores da base de saída na base de chegada.

$$M_{BF} = \begin{bmatrix} [\vec{f}_1]_B & [\vec{f}_2]_B & [\vec{f}_3]_B \end{bmatrix}$$

Propriedades

- $M_{BF} = M_{FB}^{-1}$
- $M_{BF} = M_{BG}M_{GF}$

Orientação de V^3

B e F tem mesma orientação $\Leftrightarrow \det(M_{BF}) > 0$ (orientação positiva)

B e F tem orientações opostas $\Leftrightarrow \det(M_{BF}) < 0$ (orientação negativa)

Produto Vetorial

$$\vec{x} = \vec{u} \wedge \vec{v}, \text{ tal que } \begin{cases} \|\vec{x}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin\theta \\ \vec{x} \perp \vec{u} \text{ e } \vec{x} \perp \vec{v} \\ (\vec{u}, \vec{v}, \vec{x}) \text{ é base positiva} \end{cases}$$

Se $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \{\vec{u}, \vec{v}\}$ é LD (paralelos)



$A = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ é a área do paralelogramo formado por \vec{u} e \vec{v}

$\frac{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}{2}$ é a área do triângulo formado por \vec{u} e \vec{v}

$A = b \cdot h$, $h = \frac{\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|}{\|\vec{AB}\|}$ é a altura do triângulo ABC em relação a base AB

Se estiver em uma **base ortonormal positiva**

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \text{"det"} \begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{bmatrix}, \text{ onde } \vec{u} = (x_1, y_1, z_1)_B \text{ e } \vec{v} = (x_2, y_2, z_2)_B$$

Resolvendo por cofatores na primeira linha,

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \det \begin{pmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{pmatrix} \hat{i} - \det \begin{pmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{pmatrix} \hat{j} + \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix} \hat{k}$$

Propriedades

- $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$
- $(\alpha \vec{a} + \beta \vec{b}) \wedge \vec{v} = \alpha \vec{a} \wedge \vec{v} + \beta \vec{b} \wedge \vec{v}$

Produto Misto

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \wedge \vec{v} \cdot \vec{w}$$

$V = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$ é o volume do paralelepípedo formado por \vec{u} , \vec{v} e \vec{w}

$$V = A \cdot h, \quad h = \frac{|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}$$

Volume do tetraedro



$$V = \frac{|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|}{6}$$

Se estiver em uma **base ortonormal positiva**

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \det \begin{bmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \\ x_w & y_w & z_w \end{bmatrix}$$

Propriedades

- $[\alpha \vec{a} + \beta \vec{b}, \vec{v}, \vec{w}] = \alpha [\vec{a}, \vec{v}, \vec{w}] + \beta [\vec{b}, \vec{v}, \vec{w}]$
 - $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = -[\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}] = [\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}]$ (Altera o sinal ao alterar uma posição)
 - $\vec{u} \wedge \vec{v} * \vec{w} = \vec{u} * \vec{v} \wedge \vec{w}$
 - $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ não se altera ao adicionar uma combinação linear dos outros vetores
- $$[\vec{u}, \vec{v} + \lambda \vec{u} + \alpha \vec{w}, \vec{w}] = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$

Produto Misto na mudança de base

$$\det(M_{BF}) = \frac{[\vec{f}_1, \vec{f}_2, \vec{f}_3]}{[\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3]}$$

(Produto misto da base de saída / produto misto da base de chegada)

Se V^3 está orientado,

$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] > 0 \Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ é base positiva

$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] < 0 \Leftrightarrow (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ é base negativa

$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \Leftrightarrow \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ é LD

Sistema de Coordenadas



$S = (O, E)$, é o sistema com origem no ponto O e base E .

Se E é **ortonormal**, S é um **sistema ortogonal**

$$\text{Ponto } P = \overrightarrow{OP} = (x, y, z)_S$$

$$\overrightarrow{PQ} = (x_Q - x_P, y_Q - y_P, z_Q - z_P)_E$$

$$P + \lambda \vec{v} = (x + \lambda a, y + \lambda b, z + \lambda c)_S$$

Média entre 2 pontos

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

Se S for **ortogonal**, Distância entre 2 pontos

$$\text{dist}(P, Q) = \|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2 + (z_Q - z_P)^2}$$

Retas

Equação vetorial

$$r: X = A + \lambda \vec{v} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Equações paramétricas

$$r: \begin{cases} x = x_0 + \lambda a \\ y = y_0 + \lambda b \\ z = z_0 + \lambda c \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Equações simétricas



$$\lambda = \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$$

Planos

Equação vetorial

$$\pi: X = A + \lambda \vec{v} + \mu \vec{u} \quad (\lambda, \mu \in \mathbb{R})$$

Equação paramétrica

$$\pi: \begin{cases} x = x_0 + \lambda a + \mu m \\ y = y_0 + \lambda b + \mu n \\ z = z_0 + \lambda c + \mu p \end{cases} \quad (\lambda, \mu \in \mathbb{R})$$

Equação geral

$$\pi: ax + by + cz + d = 0$$

Vetor normal ao plano

$$\vec{n} = \vec{v} \wedge \vec{u}$$

Se o sistema S for **ortogonal**,

$$\pi: ax + by + cz + d = 0 \Leftrightarrow \text{Vetor normal } \vec{n} = (a, b, c)$$

Como chegar na equação geral

- Resolver $\det \begin{bmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a & b & c \\ m & n & p \end{bmatrix} = 0$

sendo $\vec{u} = (a, b, c)$ e $\vec{v} = (m, n, p)$



Posições Relativas

Reta-Reta

- $\{\vec{r}, \vec{s}\}$ é LD $\Leftrightarrow \vec{r}$ paralelo a \vec{s}
 - Possui 1 ponto em comum $\Leftrightarrow r = s$
 - Não possui ponto em comum $\Leftrightarrow r \cap s = \emptyset$
- $\{\vec{r}, \vec{s}\}$ é LI, pegue ponto $A \in r$ e $B \in s$
 - $\{\vec{r}, \vec{s}, \overrightarrow{AB}\}$ LI $\Leftrightarrow r, s$ são reversas
 - $\{\vec{r}, \vec{s}, \overrightarrow{AB}\}$ LD $\Leftrightarrow r, s$ são concorrentes (tem ponto em comum)

Reta-Plano

- $\vec{r} \perp \vec{n} \Leftrightarrow r$ paralelo a π
 - Possui 1 ponto em comum $\Leftrightarrow r$ contido em π
 - Não possui ponto em comum $\Leftrightarrow r \cap \pi = \emptyset$
- Caso contrário, r e π são transversais ($r \cap \pi = P$)

Plano-Plano


- $\{\vec{n}_1, \vec{n}_2\}$ é LD \Leftrightarrow planos são paralelos
 - Possui 1 ponto em comum $\Leftrightarrow \pi_1 = \pi_2$
 - Não possui ponto em comum $\Leftrightarrow \pi_1 \cap \pi_2 = \emptyset$
- $\{\vec{n}_1, \vec{n}_2\}$ é LI $\Leftrightarrow \pi_1 \cap \pi_2 = r$ (intersecção é uma reta)
 - Achar a intersecção \Rightarrow igualar as equações dos planos



Distâncias

Ponto-Reta


$$d(P, r) = \frac{\|\overrightarrow{AP} \wedge \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|} \text{ (Altura do triângulo)}$$



Reta-reta

- Se forem paralelas, pegar um ponto A e fazer $d(A, s)$
- Se não,

$$d(r, s) = \frac{\|[\overrightarrow{AB}, \vec{r}, \vec{s}]\|}{\|\vec{r} \wedge \vec{s}\|} \text{ (Altura do paralelepípedo)}$$



Ponto-Plano

$$d(P, \pi) = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} \text{ (Projeção de AP na normal)}$$

Com a equação geral do plano e o ponto,

$$\pi: ax + by + cz = 0$$

$$P = (x_0, y_0, z_0)$$

$$d(P, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

